

Patient information guide to Patient-Controlled Analgesia (PCA)

Alaris® Products

You can now help control your pain relief

Your doctor has prescribed Patient-Controlled Analgesia or PCA therapy to help control your pain during your hospital stay. A PCA device will be used to allow you to give yourself small doses of medicine when you need it. Your healthcare team will review the use of the PCA device with you. The following information will also help you understand these instructions. If you have questions regarding PCA be sure to ask your healthcare team.

How PCA works

- The PCA device is programmed to deliver the medication in the correct dose for you as prescribed by your doctor.
- When you have pain, you can press the button on the dose request handset at your bedside to give yourself a small dose of pain medication.
- The pain medication is delivered through your intravenous (IV) line and may be in addition to any other medications you are receiving.
- After each dose, you must wait a prescribed amount of time (lock-out) before you can give yourself another dose. If you press the button before the time has elapsed, the PCA device **does not** deliver medication. This ensures that you receive only the amount of medication prescribed to you.

! Remember: You are the only one who should push the button to give yourself medicine. **Do not allow others to push the button for you unless your healthcare team instructs you otherwise.** Always carefully follow your healthcare team instructions.

Caution: Carefully locate the patient request cord to reduce the possibility of entanglement or strangulation.



Dose request handset

- Once therapy starts, your healthcare team will closely monitor your response to the medication, which may include your pain level and other vital signs.

When to alert your nurse or doctor

Some pain medications may cause side effects, so be sure to tell your healthcare team if you experience any symptoms or discomfort during your PCA therapy.

©2005-2007 Cardinal Health, Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Alaris® is a registered trademark of Cardinal Health, Inc. or one of its subsidiaries.
10273267

♻️ Printed on recycled paper with 10% post-consumer fiber.

Cardinal Health
San Diego, CA

cardinalhealth.com/alaris

Guía de información sobre la analgesia controlada por el paciente (PCA)

Alaris® Products

Ahora puede ayudar a controlar el alivio de su dolor usted mismo

Su médico le ha prescrito tratamiento con analgesia controlada por el paciente o PCA para controlar el dolor durante su internación. Utilizará un dispositivo de PCA que le permitirá administrarse pequeñas dosis de medicamento cuando lo necesite. Su equipo de atención médica revisará el uso del dispositivo de PCA junto a usted. La siguiente información también le ayudará a comprender las instrucciones. Ante cualquier duda sobre la PCA, consulte a su equipo de atención médica.

Cómo funciona la PCA

- El dispositivo de PCA está programado para administrar la dosis correcta de medicación, tal como fue prescrita por su médico.
- Cuando sienta dolor, puede presionar el botón del dispositivo de solicitud de dosis a su lado para administrarse una pequeña dosis de medicación analgésica.
- La medicación analgésica se administra por vía endovenosa (IV) y puede ser complementaria a cualquier otra medicación que reciba.
- Después de cada dosis, debe aguardar el tiempo indicado (de bloqueo) antes de poder administrarse otra dosis. Si presiona el botón antes de que haya transcurrido ese tiempo, el dispositivo de PCA **no** proporcionará la medicación. De esta manera, se garantiza que reciba sólo la cantidad de medicación prescrita.

! Recuerde: Usted es el único que debe presionar el botón para administrarse el medicamento. **No permita que otros presionen el botón en su lugar, a menos que su equipo de atención médica le indique lo contrario.** Siempre siga las instrucciones de su equipo de atención médica.



Dispositivo de solicitud de dosis

- Una vez que comienza el tratamiento, su equipo de atención médica controlará su respuesta a la medicación, que puede incluir su nivel de dolor y otros signos vitales.

Cuándo llamar a la enfermera o al médico

Algunas medicaciones analgésicas pueden provocar efectos secundarios, por lo tanto asegúrese de comunicarle a su equipo de atención médica si sufre algún tipo de síntoma o molestia durante su tratamiento con PCA.

Advertencia: Coloque el cable de dosis del paciente con cuidado a fin de reducir la posibilidad de enredo o estrangulamiento.

©2005-2007 Cardinal Health, Inc. o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Alaris® es una marca registrada de Cardinal Health, Inc. o una de sus subsidiarias. 10210839

♻️ Impreso sobre papel reciclado con 10% de fibra post consumo.

Cardinal Health
San Diego, CA

cardinalhealth.com/alaris