

CURSO CC 626 – en Línea

Consejería en sexualidad en niveles de prevención primaria y Secundaria

Profesora: Dra. Norma Batista García

PLANTILLA PARA REALIZAR LA TAREA DE LA SEMANA # 3 **SEMANA # 3 - Enfermedades Transmisibles Sexualmente (ETS) más comunes.**

TAREA PARA ENTREGAR POR DROP BOX EN O ANTES DEL ÚLTIMO DOMINGO DE LA SEMANA # 3

Instrucciones:

Buscará información y redactará por escrito en la Plantilla, una tabla que contendrá lo siguiente:

- a. Una tabla (como la que sigue, puede ampliarla) con la información que se solicita en cada columna (valor: 12 puntos)

Enfermedad Transmisible Sexualmente	Síntomas principales	Modos de transmisión	Referencia utilizada
Sífilis (3 puntos)	Tiene tres etapas. Primaria El periodo de incubación es de 14 a 21 días. Los síntomas son. Una pequeña llaga o ulcera abierta e indolora (chancro) en los genitales, la boca, la piel o el recto que sana por si sola en 3 a 6 semanas. Inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la llaga. Secunda etapa: de 4 a 8 semanas después de la primaria. Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y planta de los pies. Ulceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la vagina i el pene. Parches húmedos y verrugosos (denominados condilomas sifilíticos) en	Por contacto sexual, pero también puede ser de otras formas.	Medlineplus.gov

	los órganos genitales o en el pliegue de la piel. Fiebre. falta de apetito. Dolores musculares y articulares. Inflamación de los ganglios linfáticos. Cambios en la visión. Pérdida del cabello. La terciaria: Se desarrolla en personas que no han recibido tratamiento. Los síntomas dependen de cuales órganos hayan sido afectados. Varían ampliamente y pueden ser difíciles de diagnosticar. Los síntomas incluyen: Daño al corazón, que causa aneurismas o valvulopatía. Trastornos del sistema nervioso central (neuro sífilis). Masas de tejido muerto, inflamado en la piel, los huesos o el hígado (gomos).		
Gonorrrea (3 puntos)	Los síntomas de gonorrrea con frecuencia aparecen de 2 a 5 días después de que han adquirido la enfermedad y por lo tanto, no busca tratamiento. Los síntomas: Dolor y ardor al orinar. Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria. Dolor de garganta. Relaciones sexuales dolorosas. Dolor intenso en la parte baja del abdomen (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y la zona del abdomen).	Transmisión sexual, Por contacto por la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano.	Medlineplus.gov

	Fiebre (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y la zona del estómago). Sangrado uterino anormal. Sangrado después de tener relaciones sexuales. Secreciones vaginales anormal color verdosa, amarillenta o con mal olor. Si la infección se disemina al torrente sanguíneo, los síntomas incluyen: Fiebre. Erupción cutánea. Síntomas similares a la artritis.		
3. Clamidia (3 puntos)	Las infecciones por Chlamydia trachomatis en etapa temprana a menudo causa pocos síntomas, Incluso cuando se manifiestan, estos síntomas en general son leves. Los síntomas pueden incluir lo siguiente: Micción dolorosa. Secreción vaginal. Secreción proveniente del pene. Relaciones sexuales vaginales dolorosas. Sangrado vaginal entre periodos menstruales y después de las relaciones sexuales. Dolor testicular. Según la actividad sexual de una persona, la Chlamydia trachomatis puede infectar los ojos, la garganta o el recto.	La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian principalmente por contacto con genitales o líquidos corporales. Las infecciones transmisión sexual, también llamadas enfermedades venéreas, son causadas por bacterias, virus o parásitos.	https://www.mayoclinic.org
4. Herpes (3 puntos)	Existen dos tipos de herpes simple: El herpes simple tipo 1 frecuentemente causa	El herpes es una infección causada por un virus herpes simple (VHS). El	MedlinePlus.gov

	llagas labiales. También puede causar herpes genital El herpes simple tipo 2 frecuentemente es el que causa el herpes genital, pero también puede afectar la boca. Algunas personas no tienen síntomas. Otras presentan llagas cerca del área por la cual penetra el virus al cuerpo. Estas se convierten en ampollas que causan picazón y dolor y posteriormente se curan. La mayoría de las personas tienen brotes varias veces al año. Con el transcurso del tiempo, los brotes se hacen menos frecuentes. Los medicamentos que ayudan al cuerpo a combatir el virus pueden ayudar a mejorar los síntomas y disminuir los brotes.	herpes simple se contagia por contacto directo.	
Total puntos de esta tarea: 12			

b. Participación en el Foro # 1 donde se incluyó un argumento basado en la Biblia para sustentar su opinión. Emitir sus opiniones en un **Foro de discusión**, las cuales estarán fundamentadas en la Biblia en torno a la siguiente expresión: “Dios le envía estas Enfermedades *de Transmisión Sexual* a las personas, como castigo a sus conductas sexuales promiscuas”.

Rúbrica de corrección de la Actividad Académica de la Semana # 3

Criterio de evaluación	Criterio totalmente incluido (todos los puntos)	Criterio parcialmente incluido (la mitad de los puntos)	Criterio NO incluido (0 punto)
El trabajo escrito contiene los siguientes:			
Presentó la tabla requerida con toda la información solicitada en torno a las <i>Enfermedades de Transmisión Sexual</i> (12 puntos)			
Participación en el Foro # 1 donde se incluyó un argumento basado en la Biblia para sustentar su opinión. (2 puntos)			
El trabajo escrito se recibió en o antes de la fecha establecida (1 punto)			

Total de puntos: **15**;

Puntos obtenidos por el estudiante:

Nota importante: **Se descontará un (1) punto** a la puntuación total obtenida por cada día calendario de entrega tardía.